


## انعقاد داخل عروق منتشر

### شرح بیماری

انعقاد داخل عروق منتشر عبارت است از یک اختلال جدی در مکانسیم‌های انعقاد خون، که منجر به خونریزی خارجی یا داخلی می‌شود. این اختلال، عارضه‌ای از بعضی مشکلات زمینه‌ساز دیگر به شمار می‌رود.



## علائم شایع

خونریزی در یک یا چند نقطه بدن. خونریزی ممکن است شدید باشد. علائم شایع خونریزی عبارتند از: - استفراغ خونی یا مدفوع سیاه و قرمز - خونریزی از مجرای تناسلی زنان (جدا از خونریزی عادت ماهانه) - قرمز یا تیره شدن ادرار - بروز خون مردگی بدون دلیل

درد شدید شکم یا کمر در نتیجه خونریزی داخلی در اعضای بدن  
تشنج (به‌ندرت)  
اغما (به‌ندرت)

## علل

خالی شدن خون از مواد مؤثر در انعقاد و تثبیت لخته، که موجب بروز خونریزی‌های گسترده می‌شود. بروز این حالت علل مختلفی دارد:

- اختلالات حاملگی، مثل جفت سر راهی، کنده شدن زودرس جفت، یا مسمومیت حاملگی (اکلامپسی)
- عفونت گسترده یا عمده
- سرطان گسترده
- بعضی از انواع جراحی

- تخریب گسترده بافتی، مثلاً در سوختگی‌های وسیع
- گزیده شدن توسط مار سمی
- تزریق خون جور نشده با خون گیرنده

## عوامل تشدید کننده بیماری

تغذیه نامناسب  
کاهش مقاومت بدن در اثر بیماری

## پیشگیری

جهت درمان علت زمینه‌ساز فوراً به پزشک مراجعه کنید.

## عواقب مورد انتظار

اگر علت زمینه‌ساز انعقاد داخل عروقی منتشر به سرعت درمان شود، احتمال می‌رود که فرد بهبود یابد.

## عوارض احتمالی

نارسایی کلیه  
شوک  
قانقاریا و از دست دادن اندام  
خونریزی در حفره ریه



## در چه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟

- اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان انعقاد داخل عروق منتشر را دارید ، این یک مورد اورژانس است.
- اگر علائم پس از درمان بازگردند.



# انعقاد داخل عروق منتشر

**Disseminated intravascular coagulation**

تهیه و تنظیم :

دائرة آموزش بیمارستان بانک ملی ایران

سال ۱۳۹۶

## درمان

اغلب بیمارانی که گرفتار این اختلال شده اند به طور ناامیدانه ای بدحال هستند و نیازمند مراقبت ویژه در بیمارستان هستند. کمکی که اعضای خانواده می توانند، بکنند این است که نگرشی مثبت و امیدوارانه داشته باشند.

به هنگام بهبودی، کروت روی زخمها را بر ندارید. این کار ممکن است باعث خونریزی مجدد شود.

گاهی برای رفع علت زمینه ساز، جراحی انجام می شود.

## داروها

تزریق خون یا فرآورده های خونی

تزریق هپارین (یک داروی ضدانعقاد)

آنتی بیوتیک برای عفونت

## فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری

استراحت در رختخواب

## رژیم غذایی

رژیم خاصی توصیه نمی شود. هر نوع غذایی که بیمار بتواند برحسب وضعیتش تحمل کند.

آدرس : تهران، خیابان فردوسی، محوطه ادارات

مرکزی بانک ملی ایران، بیمارستان بانک ملی

تلفن : ۰۲۱-۶۱۴۲۳۷۱۰

[WWW.BMIhospital.com](http://WWW.BMIhospital.com)