



درد (۱)

تهیه و تنظیم
دائرة آموزش بیمارستان بانک ملی ایران
مهر ۱۳۹۴

دردهای عصبی چقدر جدی هستند؟

اگر چه ممکن است درد ، شما را از کار و زندگی عاجز کند اما هیچ خطری جان شما را تهدید نمی کند. حملات درد در فواصل متغیری روی می دهند اما هر چه مسن تر می شوید فاصله بین حملات هم کوتاه تر می گردد. برای درمان دردهای عصبی ، خط اول درمان معمولاً مشتمل بر داروهایی است که علائم و نشانه ها را تسکین می دهند. نوع دارویی که پزشک برای شما تجویز می کند بستگی به نوع درد عصبی و شدت علائم و نشانه های آن دارد. در صورت موثر نبودن داروها ، اقدامات دیگری از جمله جراحی ممکن است در دستور کار قرار گیرد.



آدرس: تهران، خیابان فردوسی، محوطه ادارات مرکزی بانک ملی
ایران، بیمارستان بانک ملی تلفن: ۶۱۴۲۳۷۱۰
www.bmihospital.com

این حملات ممکن است با حرکتی مثل حرف زدن یا بلع غذا تشدید شوند. درد عصب زبانی ، حلقی در مواردی فوق العاده زجر آور است. درد عصب پس سری باعث درد در ناحیه پشت سر میشود که معمولاً پشت گوش بداخل پوست سر تیر می کشد. درد عصب بین دنده ای هم در لابه لای دنده ها حس می شود.

دردهای عصبی معمولاً پس از ۴۰ سالگی آغاز و اغلب در سالمندان روی می دهد. تشخیص دردهای عصبی بطور کلی مبتنی بر علائم و نشانه های شما و رد کردن سایر اختلالاتی که ممکن است علائم و نشانه های مشابهی ایجاد کنند ، میباشد.

